



Ejes de alternativas		Vegetación	
Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
Alternativa 5	Alternativa 6	Alternativa 7	Recinto estación
Límite municipal	Límite comarcal	Tabaibal dulce (Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae)	Tabaibal amargo (Euphorbietum tamarckii s.l.)
		Cardonal (Periploco laevigatae-Euphorbietum canariensis)	Tabaibal de toda (Ceropegio dichotomae-Euphorbietum aphyllae)
		Tabaibal de tabaiba mejonera (Euphorbietum atropurpureae)	Balera (Picometum pendulae)
		Bosque temófilo (Junipero canariensis-Oleatum cerasiformis)	Matorral de espinero y granadillo (Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis)
		Matorral de retama blanca (Echio aculeati-Retametum rhodorhizoidis)	Palmeral canario (Periploco laevigatae-Phoenixetum canariensis)
		Jaral (Cistetum symphytifolium-monspelensis; Micromerio-Globularietum salicinae)	Monteverde húmedo (Lauo novocanariensis-Perseetum indicae)
		Fayal, Fayal de altura, Fayal-Brezal potencial (Pericallido murrayi-Myricetum fayae pericallidetosum cruenta)	Monteverde higrófilo (Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis)
		Brezal de crestería (Ilici canariensis-Ericetum platycodonis)	Brezal de crestería (Ilici canariensis-Ericetum platycodonis)
		Monteverde seco (Visneo mocanerae-Arbuletum canariensis)	Sauzal (Rubo-Salicetum canariensis)
		Zarzal (Rubio pericymeri-Rubetum)	Fayal-Brezal (Myrico fayae-Ericetum arboreae)
		Retamar y codesar de monte (Telino-Adenocarpion; etc.)	Escobonil y escobonillar (Scleritido solutae-Pinetum canariensis facies de Chamaeclissus proliferus; Telinetum spachianae - Pedro Gil)
		Pinar (Scleritido solutae-Pinetum canariensis)	Pinar con codesos (Scleritido solutae-Pinetum canariensis facies de Adenocarpus viscosus)
		Tarajal (Atriplici ilicis-Tamaricetum canariensis)	Cerrillal-Panascal (Cencho ciliaris-Hypparhietum sinaicae)
		Herbazal nitrófilo (Chenopodietales muralis)	Herbazal subnitrófilo seco-subhúmedo y cardales (Echio plantaginei-Galactiflora tomentosa; Urtico-Silybion mariani)
		Herbazal subnitrófilo árido-semiárido (Resedo lanceolatae-Moricandion)	Hinojal y altabacal (Bromo-Oryzopsis millicaeae)
		Matorral nitrófilo sérico: vinagral, inciensial, magarzal, etc. (Artemisio thuscusae-Rumicion lunariae)	Matorral nitrófilo desértico: ahulagar, saladar blanco, etc. (Lauaeno arborescens-Schizogynietum sericeae; Euphorbio-Schizogynietum sericeae)
		Táirtagos y veneneros (Nicotiano glaucae-Ricinion communis)	Comunidades de cernajas o beas infra-termediterráneas (Soncho-Aeonion; etc.)
		Comunidades de beroles o beas meso-supramediterráneas (Greenovion aureae)	Cinturón halófilo costero de roca (Frankenio ericifoliae-Astydamietum latifoliae; Frankenio-Zygophyllum fontanesii)
		Cañaverales, Juncuales, etc. (Comunidad de Arundo donax; Scirpo globiferi-Juncetum acuti)	Complejos de vegetación y comunidades líquénicas de maitpaises recientes (Soncho-Aeonion; Chellanion pulchellae; etc.)
		Pterales y tumerales (Plantaciones de Agave sps. y Opuntia sps.)	Plantaciones de Pinus canariensis
		Plantaciones de Pinus radiata	Plantaciones de Pinus halepensis
		Plantaciones mixtas de Pinus spp.	Plantaciones varias
		Desprovisto de vegetación	